

KULLANMA TALİMATI

ENHOŞ 2,5/2,5 g Efervesan Toz
Tartarik Asit, Sodyum bikarbonat
Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin maddeler:** Her bir doz poşet 2,5 g tartarik asit ve 2,5 g sodyum bikarbonat içerir.

Bir poşet 29,758 mEq sodyum içerir.

- **Yardımcı maddeler:**

Sade:	Limon esansı	
Limon:	Limon esansı,	E102 Tartrazin
Vişne :	Vişne esansı,	E124 ponceau 4R
Çilek:	Çilek esansı,	E124 ponceau 4R
Portakal:	Portakal esansı,	E110 gün batımı sarısı

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de ENHOŞ'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ENHOŞ nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ENHOŞ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ENHOŞ nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ENHOŞ'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ENHOŞ nedir ve ne için kullanılır?

- ENHOŞ, her bir doz poşette 5 g efervesan toz ihtiva eden, 20 poşetlik 100 g karton kutuda takdim edilmektedir.
- ENHOŞ laksatif ilaçlar grubuna dahildir.
- ENHO aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır :

- Cerrahi, radyolojik, proktoskopik veya kolonoskopik işlemlerden önce bağırsakları boşaltmak için ,
- Antihelmentik tedaviden sonra parazitlerin atılmasında,
- Laksatif (barsak yumuşatıcı) olarak

2. ENHOŞ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ENHOŞ yalnızca suyla tamamen karıştırıldıktan sonra kullanınız.

Kuru toz olarak almayınız. Kazara alınması halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

ENHOŞ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Tüm laksatifler apendisitin iltihaplanması durumunda olduğu gibi, akut karın ağrısı, bulantı, kusma ya da tanı konulmamış karın ağrısı durumlarında kullanılmamalıdır.

- Solunumun bozukluğundan kaynaklanan kandaki asitliğin azalmasına (respiratuar alkaloz), kan kalsiyum düzeyinin normalin altına düşmesine (hipokalsemi), kan klor düzeyinin normalin altına düşmesine (hipokloremi) neden olabilir.
- Kalp hastalarında, kronik akciğer, böbrek, karaciğer hastalarında, ödemi olanlarda ve düşük sodyum diyetinde olanlarda kullanılmamalıdır. İlaç alındıktan kısa bir süre sonra mide asidinin daha fazla salgılanmasına neden olur. İdrarı alkali yapar. Böbrek taşlarının teşekkülüne neden olabilir.
- Eğer, etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).

ENHOŞ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Sirozda, yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olanlarda, eş zamanlı kortikosteroidleri kullananlarda dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli alındığında sistemik alkalozu neden olur.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENHOŞ'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diğer yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ENHOŞ 'un hamilelik sırasında güvenliliği kanıtlanmamıştır; fakat ürünün bu dönem sırasında bir zararlı etki oluşturduğu düşünülmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmektedir. Yine de bu dönemde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ENHOŞ 'un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

ENHOŞ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Renklendirici yardımcı maddeler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

ENHOŞ'un içeriğinde bulunan yardımcı maddeye karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, özellikle diğer laksatifleri şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

3. ENHOŞ Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Laksatif olarak gece yatarken veya sabahları bir bardak suya iki paket kullanılır.
- Cerrahi, radyolojik, proktoskopik veya kolonoskopik işlemlerden önce bağırsakları boşaltmak için yarım bardak soğuk suya iki poşet kullanılır.
- Antihelmintik tedaviden sonra parazitlerin atılması için yarım bardak soğuk suya iki poşet kullanılır.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- Sudaki karışımı tamamen eridikten sonra içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa kullanmayınız.

Eğer ENHOŞ'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ENHOŞ kullandıysanız:

ENHOŞ'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ENHOŞ'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın.

ENHOŞ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ENHOŞ'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Önerilen dozlarda kullanıldığında bilinen bir yan etkisi yoktur.

Aşağıdakilerden biri olursa, ENHOŞ'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Ciddi alerjik reaksiyonlar.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kan basıncında düşme ve kalp debisinde azalma,
- Özellikle böbrek hastalığı olanlarda kanda baz miktarının artması (metabolik alkaloz), kanda sodyum düzeyinin normalin üstüne çıkması (hipernatremi), kanın sıvı bölümünün yoğunluğunun normalden yüksek olduğu durumlar (hiperozmolarite),
- Mide krampı, şişkinlik ve kusma.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ENHOŞ'un saklanması

ENHOŞ'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürün ışıktan uzakta ve 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Dış ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ENHOŞ'u kullanmayınız.

Eğer üründe poşet içinde sertleşme varsa ENHOŞ'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: KANSUK LABORATUARI San.ve Tic. A.Ş. • Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy- Küçükçekmece/İSTANBUL

Üretici: KANSUK LABORATUARI San. Ve Tic. A.Ş • Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy- Küçükçekmece/İstanbul

Bu kullanma talimatı 10.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.