

## KULLANMA TALİMATI

### **SUP-GLİSERİN KANSUK B 3300 mg**

#### **Büyükler İçin Suppozituar**

#### **Rektal ( makat içine) uygulanır.**

- **Etkin madde:** Her bir doz supozituar 3300 mg gliserin ihtiva eder.
- **Yardımcı maddeler:** Stearik asit  
Sodyum karbonat

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de GLİSERİN KANSUK'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **GLİSERİN KANSUK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GLİSERİN KANSUK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GLİSERİN KANSUK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GLİSERİN KANSUK' un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. GLİSERİN KANSUK nedir ve ne için kullanılır?**

- GLİSERİN KANSUK, 6 adet supozituar (fitil) içeren kutuda takdim edilmektedir.
- Açık sarı renkli, homojen görünümlüdür.
- Gliserin suyu absorbe edicidir (emicidir). Supozituar (fitil) şeklinde rektuma (makat içine) uygulanması sonucu, kısmen kaydırıcı (lubrikan) ve kısmen de lokal uyarma (stimulasyon) sonucu dışkılamayı (defekasyon) kolaylaştırır.
- Basit kabızlıkların (konstipasyonların) giderilmesinde laksatif (dışkılatıcı, dışkı yumuşatıcı) olarak kullanılır.

#### **2. GLİSERİN KANSUK' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

GLİSERİN KANSUK yalnızca rektal yoldan (makat içine) uygulanır. YUTULMAYINIZ. Kazara yutulması halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

### **GLİSERİN KANSUK’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer karın ağrısı, bulantı, kusma, makat çevresinde yarık, yırtık, yara halini almış basur (hemoroid) varsa,
- Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).

### **GLİSERİN KANSUK’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Uzun süre ve sık sık kullanılması dışkılama alışkanlığını bozabilir. Bu yüzden kısa (bir haftadan az) süreli ve mutlaka gerekli oldukça kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **GLİSERİN KANSUK’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Rektal yol ile uygulandığından kan dolaşımına geçmesi beklenmez, bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşim göstermesi beklenmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

GLİSERİN KANSUK’un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

### **GLİSERİN KANSUK’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

GLİSERİN KANSUK’ un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, özellikle diğer laksatifleri şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. GLİSERİN KANSUK nasıl kullanılır?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- 12 yaş üzeri çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda; GLİSERİN KANSUK için önerilen günlük doz bir veya iki supozituvardır (fitil).
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

#### Uygulama yolu ve metodu:

- Supozitivar (fitil) eller iyice yıkandıktan sonra baş ve işaret parmakları ile tutarak makat içine iterek tatbik ediniz.  
Fitil çok yumuşamışsa, paket önce buzdolabında 15 dakika bekletildikten sonra uygulanabilir.
- Fitil bir miktar temiz soğuk su ile ıslatıldıktan sonra uygulayınız.
- Laksatif (dışkılatıcı, dışkı yumuşatıcı) hareket için supozitivarın erimesine gerek yoktur. Dışkı ile birlikte dışarı atılır.

#### Değişik yaş grupları:

**Çocuklarda kullanımı:** GLİSERİN KANSUK 1400 mg Pediyatrik Suppozitivar önerilmektedir.

**Yaşlılarda kullanımı:** Önerilen günlük doz bir veya iki supozituvardır.

#### Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer GLİSERİN KANSUK' un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİSERİN KANSUK kullandıysanız:**

*GLİSERİN KANSUK' tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **GLİSERİN KANSUK'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **GLİSERİN KANSUK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLİSERİN KANSUK 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa GLİSERİN KANSUK'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Makattan kan gelmesi ve ciddi alerjik belirtiler (ciltte döküntü, kabarıklık, nefes almada zorluk, göğüs sıkışması, ağızda, yüzde, dudaklarda ve dilde şişme).

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Makattan kan gelmesi.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Karın ağrısı, makat çevresinde deri tahrişi veya yanma hissi.

Bunlar GLİSERİN KANSUK'un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. GLİSERİN KANSUK' un saklanması**

*GLİSERİN KANSUK' u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30 °C altında oda sıcaklığında saklayınız.

**Dış ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİSERİN KANSUK'u kullanmayınız.*

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLİSERİN KANSUK'u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** KANSUK LABORATUARI San.ve Tic. A.Ş.

Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-Küçükçekmece/ İSTANBUL

**Üretici:** KANSUK LABORATUARI San. Ve Tic. A.Ş

Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-Küçükçekmece/İstanbul

*Bu kullanma talimatı 31.05.2011 tarihinde onaylanmıştır.*